

萬氏秘傳片玉心書

萬氏秘傳片玉心書卷之五

羅田密齋萬一

玄脈通之萬達刻

瘡疾門

瘡疾治法有二新瘡先截後補久瘡先補後截

子瘡要分早晚治之如上半日發者此邪在陽分氣
位也先用平胃散加常山草果截之後用平瘡養
脾丸調理而安如下半日發者此邪在陰分血
位也輕者以四物湯加桂枝桃仁紅花發出血

寒邪甚者以麻黃湯如升麻當歸提到陽分
虛以小柴胡湯加常山草果截之畧愈以平癰
養脾丸調之而安

如癰來寒多熱少者以平胃散加常山桂枝草果仁
截之熱多寒少者以白虎湯加常山草果青皮截
之寒熱相半者用小柴胡湯加常山草果截之后
以平癰養脾丸調之如大人以補中益氣湯調之
以上數症皆先截后補也

如久癰連綿不退者或二三日一次其邪已深不可

妄用截藥只以平瘡養脾九調之有汗要无汗无汗要有汗其瘡易退再要避風寒禁雞魚冷水死不安者如犯禁戒雖九轉灵丹亦难治也

凡瘡後轉作痢症者此症多得于夏末秋初因内有伏阴多傷生冷故也當從虛治不可妄用通利之藥如平常下痢者以香連九米湯送下

如瘡痢併作者以平瘡養脾九橘皮和中九相間之服如瘡后遍身浮腫者此因汗后受風故也以胃養九加五加皮大腹皮灯心長流水煎湯治之大兒加

臧胃苓湯治之外用浴法于日當午時向避風處以溫水拂拭遍身畧腫一時以被蓋之微汗為度每日依此行之為妙甚効

如癰在腹脹或喘或不喘者此因內傷生冷脾肺俱病故也蓋脾主脹喘屬肺以痛氣尤消脹以尋虛丸定喘治之以集聖丸調之

如癰在腹中有痞者此癰母也因多食冷水所至亦有熱而臧者治以月蟾丸主之

凡癰后形體黃瘦者只以集聖丸調之

平月散

此治濕養脾之藥也

蒼朮

米泔浸炒 一斤二分 厚朴 姜汁炒 一斤

陳皮

二斤 厚朴 一斤

加

常山

三斤 草果 三斤 姜來引

四物湯

見前 此藥性平治血不足之聖藥也

桂枝湯

此發散風邪之藥也

桂枝

赤芍 甘草 姜來引

小柴胡湯

此半表半裏之藥也

柴胡

二斤 黃芩 一斤 半夏 七人參 七斤 甘草 五斤 加山枝

丹皮名加味小柴胡湯

姜來引

心中飽悶加

枳壳 桔梗 痞滿加黃連 枳實 渴加知母 石膏

內熱甚 錯語 心煩 不得眠 者 合 辟瘟湯

白虎湯 此藥性寒 所以治熱也

石膏 五知母 粳米 甘草 水煎服

以上諸方 截瘧 必用 常山 草果 者 蓋此二味 乃治

瘧 必用之藥也

補中益氣湯 此補中氣 不足之聖藥也

黃芪 人參 甘草 柴胡 升麻 白朮

當歸 陳皮 木煎身來 刺 有汗用白朮 無汗

川蒼朮治瘧加青皮

加減胃參湯 此參利之聖藥也

米苓 澤泄 赤茯苓 白朮 官桂 五加皮

蒼朮 陳皮 厚朴 甘草 木通 大腹皮

防風 生薑皮 灯心 姜引 取順流水煎服

平癰養脾丸

歸身 人參 陳皮 去穢各 黃芩 二 草果仁 一

南星 炮一 白朮 一 白茯苓 一 紫胡 五 甘草 五

共為末米糊丸如黍米大竹葉炒米湯下一方加

常山

黃芪

鱉甲

醋炙
黃色

月蟾丸

木香

人參

黃芪

當歸

桔梗

火君子肉

黃連

山稜炮

枳實

義木根鱉甲炙苦練根皮

乾蟾

燒存柯子肉

夜明砂

綠凡

各并共為末

醋糊丸陳米湯下

祖傳治瘰之法以斬龜丹截之胃苓丸調之常用平

胃散加常山草果為末每服一字于臨發日五更

用桃柳枝七根煎湯調服

治大人癰疾方

人參

五

常山

三

酒炒

一

換即

三

草果仁

四

紫豆粉

炒

其草

貝母

三

青皮

五

水煎服

又方

常山

換即

一

當歸

三

蒼朮

五

甘草

三

陳皮

五

先一服用酒搗細滾酒泡服如不效將桃枝七根

灯心七根水煎二三滾露一宿發日五更溫服禁

生冷鰓魚發物

西江月

瘰癧疾來時潮熱內傷外感生癰初時截法似神仙不可
暴虎遺毒外感小柴飲子內傷平胃為先內加
草果與常山東西桃柳枝煎

截后緣調脾胃只消清癰養脾法邪補正作良臣不
讓仲陽錢氏癰久著成瘡塊面黃腹滿消肌月蟬
集聖是根基此個方兒密記

如是小兒久癰或于半后來潮又如間日又三朝截
法不宜急暴只用養脾清癰相其集聖和調神丹
蘇氏真韓氏曉日五更分曉

瘕痢如逢餅作其間言而須知六端飲食要如時胃
氣完全可治若是不思乳食強將脾胃扶持胃寒
死子其差池間以香地止痢

久瘕多成壞症脾焦肚大青筋頭乾脚細臍元神欲
食全然不飽面目羸瘦怯弱四肢無力难行不須
醫治枉勞心尤死一生危病

平瘕養脾用人參

白朮陳皮當歸身

茯苓厚朴姜汁炒

蒼朮五錢米水浸

粉草半夏浸七次

青皮柴胡與黃芩

常山草果二錢半

鹽水五錢勸飲

發熱門

小兒凡病有熱症既不同治亦多異酒分虛實不可妄用汗下也

陽風發熱其症汗出身熱呵欠目赤澀多睡惡風喘急此因解脫受風所致宜疎風解肌退熱先服紫荷餅收湯發去風邪待過七時再服涼驚丸以防內熱

陽寒發熱其症无汗身熱呵欠煩悶煩急而未喘急

惡寒口中氣熱此因解脫受寒所致宜發散寒邪
退熱鎮驚先服醒脾散發去寒邪後以涼驚丸以
防內熱 以上二症如小兒驚賦原寒者可用涼
驚丸若虛怯者不如只用胃苓丸甚効

如傷風寒發熱又吐泄者不可發散此脾虛怯也只
以五苓散吞理中丸甚効

傷熱發熱多得于憂其症身熱自汗作渴昏睡手足
俱逆此因天氣已熱包裹太重受其熱也先以
白虎湯調益元散以解其熱次服調元生脈散以

補正氣

傷暑發熱亦多傳于裏其症身熱自汗作渴昏瞶手足冷此由阴寒中食涼太過所致服調元生脉散補其元氣次服四君子湯以防吐泄之病

如夏月汗出常風以致身熱渾身自汗不寧者此名暑風四君子湯加麻黃根黃芪以去風次以益元散以去熱

傷食發熱其症手心脾腹脹滿噎氣吐乳大便酸臭或腹疼多啼飽脹喘急不思乳食此因飲食過度

所傷宜先用利藥去其積用丁香脾積丸復以集
聖丸調之

如傷食已久日漸黃瘦先時作熱者不可下之輕者
保和丸重者集聖丸百无一失

痘疹發熱其症面燥腮赤目胞亦赤呵欠煩悶乍熱
乍涼咳嗽噴嚏手足指冷驚怖多睡此由時行痘
疹各相傳染宜清熱解毒惟痘疹宜參蘇飲加水
香麻痘宜用荆防敗毒散不可妄施汗下恐生變
症若變蒸發熱此小兒常症不須服藥見本門

潮熱者當分二症有時間發熱過時即退來日依時
復發其狀如癰此肺熱也將早晚發熱每日兩度
如潮水之應期者此胃熱也蓋因感觸邪氣以致
血脈凝滯不得流通若不治之變為驚悸者多矣
肺熱地骨散主之胃熱三黃丸下之如虛熱者用
集聖丸調之

驚熱者遍身發熱而青自汗心悸不寧脈數煩燥煩
躁恍惚此心熱也以涼驚丸退熱安神丸定心
以熱者但夜發晝退此血虛症也以人參當歸散治

之更無抱龍丸以防作搐

論熱者傷寒汗出而熱又來乃表裏俱虛氣不歸元
陽浮于外不可再用寒涼之藥古人戒之當和胃
氣使陽氣收斂其熱自退人參養榮主之甚者四
君子湯加炒乾姜即効

瘧熱者形色黃瘦食不長肉骨蒸盜汗泄瀉无帶壯
大脚小此多得于大病之后失于將息又或傷飽
失飢用集聖丸調理

壯熱者一向熱而不已由氣血蘊滯五臟生熱鬱蒸

于内則睡卧不安精神恍惚驚悸于外則表裏俱
熱燥急喘粗甚則張臂癰先以導赤散泄青丸以
治其熱后以抱龍丸鎮其驚如實熱大小便秘者
三黃丸下之

煩熱者心燥不寧五心煩熱四肢溫壯小便赤色宜
導赤散加麥冬山梔仁治之再以涼驚丸撤其餘
邪

積熱者煩赤口瘡大小便赤澀此表裏俱實或內傷
酒麵煎燂熱蘘峻補外因厚綿炒火所侵皆能生

此內外蘊積之熱也并食積先以三黃丸下之
后以涼驚丸調之

三焦皆或因汗下太過津液虛耗或因大病之后元
氣受傷皆能生熱其症困倦少力面色青白虛汗
自出浸淫氣軟弱手足厥冷此氣血俱虛氣虛則
覺歎血虛則發熱也四君子湯加炒乾姜甚著加
熟附子一片待熱少退以涼驚丸調之

客熱者陽邪下于心也心若受邪則熱形于額故先
起于頭面而身熱恍惚多驚聞聲則恐此由正氣

虛而邪氣勝故其交爭發渴死時進退不定如
客之往來先以導赤散去其邪以涼驚丸調之
瘧熱者由乳食不消伏結于中致成瘧塊以生內熱
薰灼于外集聖丸主之

瘧熱者寒熱往來有頭痛汗出者有嘔吐不食憎寒
壯熱作渴者有遍身疼痛者或吐泄者症既百出
病非一端頭痛汗出及遍身疼者小柴胡湯加蒼
朮羌活治之噤痛者脾積丸下之作渴者白朮散
治之吐泄者理中湯治之后用平瘧養脾丸調之

血熱者每日巳午時發熱遇夜則涼此心熱也輕者
導赤散重者四順飲治之

柴葛解肌湯

柴胡 乾葛 黃芩 桂枝 赤芍 人參

甘草 竹葉七皮姜束引

怪散

人參 白朮 白朮 甘草 桔梗 天竺粉

細辛 防風 川芎 加麻黃 薄荷葉 姜引

調元生肺散

黃參 人參 麥冬 甘草 五味子 水煎

參蘇飲

人參 半夏 茯苓 甘草 桔梗 枳殼

乾葛 前胡 木香 蘇葉 陳皮 姜枣引

防風敗毒散

生地 防風 連翹 升麻 剝芥穗 牛蒡子

玄參 滴楠 人參 桔梗 甘草 水煎服

地骨皮散

知母 紫胡 升草 炙地骨皮 赤茯苓 半夏

姜三片引水煎服

人參當歸散

人參 歸身 生地黄 地骨皮 柴胡 甘草

生薑引

四順散 解小兒疳熱

當歸 大黃酒蒸 赤芍 升麻 水煎服

祖傳治發熱不閉其症脾胃虛弱者以胃苓丸竹葉

炒米湯吞元氣虛者以涼驚丸竹葉湯荷灯心湯

送下隨症用引

西江月

小兒病則生熱。須知得病根苗。風寒外感。燕來潮。飲食內傷。煩燥吐泄。癰痢瘡疥。變蒸痘疹。如燒骨蒸。體熱漸成。勞調治般。分曉。

若是風寒外感。面紅又惡風寒。惺惺散子。妙難言有。咳參蘇効驗。飲食內傷。可下三黃脾積。和參再加。集聖保平安。莫使脾虛難轉。

泄胃苓最妙。赤白痢用香連。瘧家平瘧。解和干瘧。疥胡麻丸散。變蒸小兒常病。不須安用。溫丸如逢。

瘧疾別傳集至專調疴軟

出熱汗下休錯誤汗誤下傷人應汗而下痞滿侵
下而汗驚走只為不明表裏致令兇命早傾果雄
從換且因循藥用胃本集至

哮喘門

哮喘之症有二不離痰火

有卒感風寒而得者有曾傷鹽水而得者有傷醋湯
而得者至天明則發連綿不已輕則用五虎湯一
帖重則葶蘆丸治之此皆一時急解之法若要斷

根常服五至丹外用灸法

五至丹

天南星

煨一兩

半夏

泡七次

陳皮

去白穰水

甘草

杏仁

四十九粒另炒

先以

南星半夏二味

研末

姜汁

皂

角汁

拌勻和作餅

又將

甘草陳皮

研末

取竹瀝一

碗

以藥和成餅

子焙乾

又浸濕

又焙乾

竹瀝盡為

度

再研杏仁

泥蒸密和為

丸臨時噙化

一丸以薄

荷湯送下

取心

以仁書

片

尾三軍

各三

枚

仍禁酸

鹹辛

辛

辛

取心

以仁書

片

尾三軍

各三

枚

仍禁酸

鹹辛

辛

辛

取心

以仁書

片

尾三軍

各三

枚

仍禁酸

鹹辛

辛

辛

熱之物

西江月

哮喘症雖有二皆由痰火中藏或被風寒襲外方因
披鹽水醋哈亦有乳哈而得致令攻膜為殃用藥
調理法雖良斷根灸法為上

哮喘多成宿疾天阴飲雨連綿治時發表及行痰九
室時常靈驗表邪未除五虎棗突毒蘆為先不須
砒石作成九悞了孩兒命短

咳嗽門

咳嗽治法有三有發汗有下泄有清補
如初起挾風寒外感者轉則蘇沉九室湯重則五虎
湯一帖即効

如咳久身熱喘急此肺中伏火也以葶藶丸利之
如咳久肺虛連綿不已即當補肺阿膠散主之
如咳久連声不已口鼻出血者茅根湯主之
如夏月得咳嗽者以加味白虎湯治之不可汗下
方

產門

咳痰甚者以利痰丸主之方見醫門

如咳久成龜胸者以葶藶丸主之

如咳嗽吐血者二陳湯加薑汁主之

如咳嗽咽痛聲啞者以耳柿湯主之

蘇沉九寶湯 此發散之藥也

桑白皮赤去 甘草 大腹皮 官桂 陳皮 蘇葉

麻黃節不去 烏梅个一 薄荷葉 杏仁皮不去尖 各等分 姜

引水煎微汗為度

五虎湯 此發散之上藥也

麻黃匕 杏仁个一 甘草四 細茶炒七 白石鹽半 水

滋陰清肺風

辛薤丸 泄肺喘通水道

甘葶薤 炒黑 牽牛 炒杏仁 杏仁 去皮 漢防已 各等分

共為末然入杏仁泥和之束肉同搗為丸淡薑

湯送下

阿膠散 定喘消痰止咳此補肺之藥也

牛旁子 井草 杏仁 烏龍茶 阿膠粉 炒珠 成

糯米 水煎服

考恨湯

陳皮

去白

半夏

炒枳殼

甘草

天冬

去心

杏仁泥

片參

枝子

貝母

知母

石膏

瓜蒌霜

生地

桔梗

水煎取茅根自銖汁和服

凡咳嗽日久而青而光其氣喘促哽氣時多出声唇

白如練此肝氣旺而肺氣絕者不治一

凡咳嗽日久喉舌生瘡其声啞者不治

凡咳嗽日久胸高而喘肩與胸脇俱動加驚搐者治不

凡咳嗽日久潮熱喘急一咳之時面青黑目上流血

從口鼻長出者此本火旺盛而肺已絕不治

凡咳嗽日久面白唇青目閉悶亂頭搖手攞者此肺
氣將絕不治

西江月

小兒或病咳嗽醫家症要分明咳為有傷于肺經嗽
則脾家痿痺有聲平痰是咳无声有痰嗽真時乎
咳嗽病同臨有聲有痰一定

小兒傷風咳嗽其症身熱憎寒自汗燥煩不安然日
夜嗽声尤過時常鼻流清涕咽喉不利痰涎肺滑
頭痛症多端治則宜乎發汗

咳嗽或傷寒症此因飲冷形寒冬月坐卧濕地開
被冷風吹犯其症脉緊无汗煩燥不渴惡寒治宜
發散汗為先藥用參蘇飲驗

若是咳嗽傷熱其症面赤燥煩飲水不止隔咽乾咳
唾稠粘症現甚則急喘而喘痰涎必生喉咽潮熱
手足或冰寒小兒多有此患

咳嗽若患火症決然咯唾血濃甚者七竅血流通此
是肺熱火動若吐青綠白水胃冷停飲相攻嗽吐
痰涎乳食中宿滯不消取用

要知治嗽大法依時認症扶持
春不外感症無疑夏
是炎上火氣秋則肺傷燥熱冬為風冷相隨相時
而動作良医对症依方用劑

大抵實者當下虛則補薄為重寒者溫散藥中推推
症清涼為貴凡則佐當發散停痰消逐為施初然
止泄莫畏之總要化痰順氣

肺乃五臟華蓋皮毛為感風寒初起醫治汗最為先杏
仁麻黃桑白皮薄荷石菖蒲草黃芩桔梗人參前胡
枳壳明茶煎一服諸風悉散

久咳不宜發汗化痰順氣為宜潤下至液有補奇不
効百行湯劑貝母陳皮枳壳茯苓并草桑枝蒲扇
薄荷杏仁泥有熱石膏堪取

久咳痰壅發熱看他二便何如若还清利是中虛只
用抱龍區處如果秘結寒熱帶蘆五色驅除要分
虛實不須拘此是小兒命主

久咳連声出血清金降火為佳參連并桔欬冬花知
貝二冬多下去白陳皮枳壳蒲胡地骨霜瓜蒌苓
玄參茅根加此個方見无價

大凡咳嗽治法必須清化痰涎化痰順氣最為先氣
順痰行咳減順氣陳皮枳壳化痰半夏夏天南黃芩
按子火邪干桔梗茯苓開滲

虛咳時加作熱西黃氣短无神當歸陳皮白朮苓按
子黃芩枳梗知貝前胡天麥耳草枳壳人參更加
黃栢炒如神散用生姜作引

久咳連声不已面青目窳常吁胸高有息汗如珠臉
白唇青背屈骨瘦如柴潮熱鼻乾髮燥神虛嘔噎
驚搐不須拘縱有灵丹无驗

蝦蟇瘳論症治歌

咳嗽小鷄鳴痰多吐血淋非麻湯一劑管叫得安寧

心腹痛門

心腹痛有六有寒有熱有食有積有蟲有霍亂

小兒外感風寒內傷冷物胃氣當心而痛啼哭悶
絕手足冷或吐或不吐以熱手按摩則止者用草

豆蔻丸主之

凡小兒受寒遠腹疼痛叫哭不寧手足冷汗出或泄
或不泄得熱稍定以理中湯主之

凡小兒腹痛無時暴發者此積痛也不可數下則
乳傷而難愈以集聖丸調之

凡小兒飲食之后卒然腹痛此傷食也須問其平日
日有此疾否若原無此疾作傷食者以丁香脾積
丸利去所傷之食用原傷之物煎湯送下后以集
聖丸調之若原有此疾當作積論

凡小兒心腹疼痛嘔雜口吐清水而黃肌瘦得食即
止肚飢又作嘔雜痛此蟲痛也先用雄黃解毒丸
苦練根白皮煎湯吞下追去其虫后用集聖丸調

之知元氣弱者不可下只用集聖丸主之

凡小兒昼則死事夜則啼哭此腹痛也蓋暖屬脾痛
主寒遇夜則發脾寒甚也以理中丸灯心燒灰煎
湯下

草豆蔻丸

草豆蔻麵包煨去陳皮大澤泄半夏各一

桃仁七粒去麥芽炒二神曲炒紫胡姜黃各四

共為末湯浸蒸餅為丸白湯下

丁香脾積丸

丁香

良姜

醋炙各五斤

木香

巴豆霜

三棱

煨

莪朮

各三斤

青皮

醋浸去白五斤

皂角

燒存性二斤

百草霜

四斤

共為末醋糊丸有積齒香湯下

傷食原物湯下

水泄者井草湯下

祖傳治腹痛甚者解毒丸下之輕者脾積丸下之

凡小兒心腹痛急面青手足冷指甲青目上胤闊乱

煩燥狂言邪譫噴鼻喘急者皆不治

西江月

凡遇小兒腹痛必須察認原由面黃腹痛食中求驗

白肝虫作楚指冷而青寒痛三家啼哭无休或濕
或下藥先按不可認時差謬

積痛先行脾積兼脾以次調和虫家別用取虫科集
至勤之服可寒痛理中最好茱萸湯引宜多至時
腹痛又如何集至妙如利藥

積痛有時發作面黃腹脹難痊丁香脾積下當先后
用養脾調緩蒼白青陳曲麥苗香我朮山稜砂仁
灵脂木香熟枳實黃連川練

虫痛時作楚面白青水長流
枳即芦薈與糖越君

子蘇黃陳肉白朮木香靈脂黃連及砂藜鱉青陳
乾蟬與麥曲磨去痛降是掃

疝氣門

疝氣初得屬寒久則屬火

凡小腹疼痛外疝腫硬者此名疝氣蓋由小兒久坐
溫地以致寒氣內侵于肝而得所以小腹刺痛外
腎腫硬但左為偏墜右為膀胱輕者內服五苓散
加茴香川練子橘核核即少加水通屢試屢効甚
者加附子一片即効后服茱萸內消丸調之外因

敷藥及薰洗法

凡小兒性急多啼有傷于脾肝以致羣丸腫大下
者小腹不痛但外囊溽大汨汨有声此宜二陳湯
去耳草加海藻昆布荔枝核小茴香川練子為末
順流水調服更以瀉青丸去大黃加青皮相間之服
敷藥用蚯蚓糞不拘多少為細末以葱汁調敷腫

處一日一換以消為度

薰法用葱搥研細煎百沸湯入鹽少許以瓶盛之
令小兒正坐其上蓋其腫處待水溫洗之后加敷藥

灸法 牽小兒兩臂向腰側比之盡處是穴左則取
左右則取右併灸三兩交穴各三壯

祖傳治小兒疝氣偏墜用萊菔內消丸外用敷藥

西江月

疝氣如何而得下焦結膀胱腎囊腫大似茄樣左
右墜難低當內服萊菔九子外用龍土葱湯待他
痛止腎消囊再灸兩邊膝上

我有得傳妙法楠核木香沉香茴香大小用相當食
鹽故紙為上巴豆少炒川練去巴取練如常研為

小兒調營一服汗淋停當

浮腫門

浮腫治法開匙門者發汗也潔淨肝者利小便也

凡小兒面目遍身浮腫者或因胎稟虛弱卒冒風濕或因瘵疾汗后不曾禁風皆成此症輕者用胃苓丸治之重者用加減胃苓湯治之

凡小兒浮腫又加喘急者此脾傳肺也當專治脾而兼治肺目服加減胃苓湯夜服葶蘆丸如先喘急而后面目浮腫者此肺傳脾也當專治肺而兼治

脾胃服寧蘆丸或服胃苓湯加麻黃杏仁

如先浮腫而后腹脹者此表邪傳裏也只以加減胃

苓湯主之

凡浮腫不可妄用汗下雖不宜用大戟葶藶牽牛之

類以傷元氣

加減胃苓湯

陳皮

蒼朮

厚朴

姜汁炒

甘草

豬苓

赤茯苓

澤泄

木通

白朮

官桂

滑石

防己

五加皮

生薑皮

國藥而致者加 麻黃杏仁桑白皮

腹脹者加 大腹皮木香枳即蘇梗去茸草

氣虛者加 人參 灯心引煩取長流水煎溫服

浴法 于平時通蒸百沸湯畦風處浴之益爽零聚

微汗目上依此行之効

祖傳治浮腫只用胃苓丸用長流水五加皮灯心煎

湯吞外用浴法

凡浮腫氣促面黑脉微細不飲食者不治

西江月

小兒病患浮腫或因胎氣羸虛率因風溼外邪致以
致渾身腫起又或諸病汗下脾虛又被風吹遂致
浮腫甚憂虞症別輕重用劑

輕用胃參九子重則加減堪行再用浴法保安寧此
法古今未定亦可太施汗下太補亦不宜行能依
方法救孩嬰方可稱為司命

大抵浮腫治法也門淨肝源知木通防已五加皮蘇
葉車前滑石滲澤瀉各飲子補脾平胃源宜灯心
長流水煎之每日清晨早吃

要識浮腫死症氣候面黑須憂肺微細小不堪謀飲
食不殮難救臍顛糞如羊屎太山倒了難扶忽生
大喘肺經虛縱有丹何救

脹滿門

脹滿專属于肺有虛脹積脹熱脹寒脹

虛脹者或因吐泄或悞服下藥致成脹滿者此宜補
中調氣利小便以四君子湯去甘草加厚朴陳皮
蒼朮木香木通治之蓋中滿忌甘草所以去之若
厚朴乃脹滿必用之藥

積脹者腹中原有食積結糞小便黃腹時作痛微喘
脈實時飲水又不能食者可下用下者脾積尤
下后以集聖丸調之

如脾胃素弱不能消導運化傷食作脹者先補脾四
君子湯去甘草加厚片陳皮砂仁后以脾積丸下
之后天補脾集聖丸主之輕者只以保和丸調之
熱脹者渾身壯熱而赤煩燥大便秘結此因胎稟素厚
誤服藥而致者急以三黃丸下之不通者用胆導
法下后以胃苓丸調之

寒脹者因寒積鬱結而照手足厥冷而青氣急先以
塌氣丸治之后以胃苓丸調之

凡脹滿喘急除寒脹一症其餘俱以葶藶丸治之
亦有通身瘡疥因淋洗塗搽通毒歸內而腹脹者輕
則敗毒散治之重則解毒丸下之瘡出脹消而愈
如面青黑氣上急手足冷目直視或目閉嘔乳者
皆不可治

塌氣丸

之胡椒兩一鴉稍

五升

共為末製糊丸陳米飲下一方

加龍苜子名楊九子

敗毒散

荆芥

防風

連翹

枳殼

柴胡

薄荷葉

羌活

獨活

桔梗

乾薑

木通

金銀花

黃芩

川芎

甘草

山枝子

土硫

加葱三煎

下腫

加灯心

一握

姜三片

引水煎服

凡腫脹大小便不通嘔吐者不治

凡腹脹喘急氣長出目閉不食者不治

凡腹脹喘促驚搐亂者不治

和傳治服滿以解毒丸下之胃苓丸調之

西江月

服名爲惡症寒熱實虛分明忽然飽悶勢律猝傷
食熱家休認吐泄服而寒邪大便秘而實因四肢
浮腫溫家尋痞瘕久成虛癆

傷食服而急下三后还用保和者是寒服理中可塌
氣神方不錯秘結三黃葶藶木香順氣宜多胃苓
又是溫家科痞瘕月婢堪妥

實症悶亂喘滿治宜白餅靈丹其喘作虛者溫藥

補養方驗二朮參苓厚朴陳皮木香當參更加木
通利小便此藥虛症可也

凡治小兒虛服先服導氣神方不愈食積腹中藏糞
結小便黃燥但寬時間微喘飲水能食如常脉浮
而實下為良下后丹宜補養

大抵腹脹急症皆平肝哭多凶二便秘結七難通反
吐水漿堪痛氣喘服藥常病只愁目閉痰癰面赤
脚細黑筋叢集至九子妙用

小兒服藥多因食

山查曲藥木香陳

甘草 仁同入內

寒加茱萸熱加苓

小兒患腹脹紫羅葛陳甘食少加白朮煎服自然安

黃疸門

黃疸不必分五樣總是濕熱

凡小兒身皮目皆黃者黃病身痛背強大小便澀一身面目指爪俱皆黃小便如壅漏壅水色着物皆黃濁者難治此黃疸也其症多得于大病之后以茯苓滲濕湯主之

如小兒生下百目及半年不因病后身微黃者胃熱

也加減瀉黃散主之

如面黃腹大吐食而渴者脾痺也集聖丸主之

又有自生而身黃者胎疸也地黃湯主之若淡黃者

白朮胃怯白朮散主之

如夏月身體暈熱胸膈煩滿皮膚似橘白睛亦黃者

骨痿弱不能行立者脾胃鬱熱也加減瀉黃散主之

通治黃疸茵陳五苓散尤穩

如吐泄黃疸三棱湯主之

茯苓滲濕湯

白朮 澤泄 茵陳 猪苓 黄芩 黄連

枳子 防己 白朮 蒼朮 陳皮 枳壳

水煎徐溫服

加減瀉黃散

黃連 茵陳 各五 黃精 黃芩 茯苓 枳子 各五

澤泄 各二 水煎

三稜湯

三稜 莪朮 青皮 陳皮 神曲 茯苓

甘草 黃連 白朮 茯苓 傷食吐泄加山查

特氣吐泄加滑石 發熱加薄荷 水煎

桂傳治黃疸以胃苓丸一劑加茵陳末五錢同為丸
用竹葉灯心車前子煎湯吞服

九發黃大渴不止面黑鼻氣冷寸口无脉者不可治
請汗門

汗者心之所藏在内為血在外為汗

小兒氣血纖弱膚腠未密若厚衣太暖蒸熱肺脾
肺生熱不得于時故液不能自藏而額汗斷也額
屬心本傳宜收斂心氣用參湯主之此虛汗也

如大病后氣血尚弱液雖自汗或潮熱或寒熱發
之後身涼自汗日久令人黃瘦失治則變為骨蒸
并癆黃茂固真湯主之

如睡中汗出不睡則死汗乃腫潰也醒老則止而不
後出汗亦是心虛此盜汗也宜欬心氣團參湯主之

如睡中遍身汗出醒竟時久不乾此積症盜汗脾冷
所致益黃散主之

如病困睡中身体汗流此因陽虛所致黃芪固參湯
主之

如脾虛泄瀉自汗而通身冷初汗出有時遇泄則
无未泄則有此為大虛症急當補脾宜理中湯加
熟附子待泄止又以黃芪同真湯主之

凡自汗上至胸下至臍此胃氣虛也當補胃四君子
湯加黃芪治之

如肺虛自汗其症有臉色多晄白肺熱之无力蓋因
久咳嗽連声不已以致肺氣上壅故令汗出以四
君子湯加麥冬此補肺收汗之義也

如慢驚自汗遍身俱有其冷如水此危症也大補湯

如熱附子一片治之

如傷風作熱自汗者宜收表解肌以紫葛解肌湯之
如死時冷汗出髮根如頭珠面額上澀然此為驚
風宜抱龍丸四君子湯加麻黃根治之

凡小兒自汗上至頭下至項謂之六陽虛汗不須治
之自愈

凡小兒傷寒汗出至頸而止者此欲發黃茵陳湯
凡諸汗症服前藥不止者俱加牡蠣粉或止汗散
調之如有實熱在內煩燥汗出不止三黃丸下之

固參湯

人參

當歸

各三片

桂猪心

一个切五片

每藥二片猪心

一片非水中半煎一中食前溫服

黃芪固真湯

黃芪

人參

白朮

甘草

當歸

麥冬

水煎

黃散

陳皮

一两

青皮

枳子肉

枳實

各五片

丁香

二片

為末

每服二分未迴歲者只服五分水煎如感寒中

泄加姜枣

大補湯

當歸

人參

黃芪

白芍

生地

枳殼

三

白朮

白朮

川芎

加附子

去苓

芎

一

攝為引水煎

止汗散

以敗蒲扇燒灰灯心湯調下或酒調亦可

夜啼門

夜啼之症有四驚啼熱煩啼腹痛啼神不安啼

驚啼者邪熱乘于心也當安心以導赤散加灯心照

心熱以安神丸定心効

悲煩啼者其哭无淚見灯則喜而止以導赤散加麥冬枝子仁治之

腹痛啼者脾脾冷而痛也西青而米中溫中藥調理中氣益黃散治之

神不安啼者睡中忽驚自哭以安神丸灯心燒灰調湯吞服

又有拂其性而抑哭者要審明白不可妄投藥丸祖傳治夜啼以至至聖保命丹灯心灰調湯下甚効

西江月

小兒夜啼四症忤驚肚疼心煩如逢拗哭忤家言睡
中忽啼驚見肚痛手足厥冷腰曲口氣水寒心熱
煩燥不安眠其症面赤腹暖

託辨夜啼症候其間治法須明分明傳授與人問只
得心誠求遍忤驚安神九子理中專治脾疼涼驚
錠子治心煩總用灯花妙散

灯花散 用灯花七枚辰砂一分研末灯草湯吞

疳症門

丁奚者手足極細項小骨高尻削體瘦腹大睛哭號
哭胸陷骨癰漸熱是也哺露者虛熱往來頭骨分
開翻食吐虫煩渴嘔涎是也丁奚哺露皆因脾胃
久虛不能化水谷以致精神減損元以榮其氣故
軀肉消削腎氣不足復為冷風所傷骨枯露也
小兒十五以上為癰十五以下其症為癰此皆氣血
虛憊腸胃受傷致之同出而異名也蓋小兒易虛
易寒凡病久則成癰用藥乖力飲食過度將息失
宜俱成癰症俱用集聖丸加減治之

小兒臍臍嬌嫩飽則易傷飲食失常不為疳者鮮矣
或小兒失乳粥飯太早耗傷神氣則疳之根生故
乳食稍多過飽无度則疳因傷得恣食肥甘粘膩
生冷醃酸以滯中脘則疳因積生

乳母睡臥寒煖失其調理飲食乖常喜怒房勞即

與兒乳則疳因母患傳氣而入以致脾胃一傷諸

疳皆弱但見目澁或生白膜唇赤身黃喜卧冷地

愛吃泥土泄痢无常肚腹脹滿耳鼻生瘡頭髮作

穗脚弱項小極瘦飲水潮熱進退皆其症也以集

至九本方調之無服參苓白朮九百死一失

有因大病妄投吐利之藥以致胃虛而亡津液內發
虛熱外消肌肉者以集聖九去莪朮青皮加人參
白朮治之

有因熱病不退以致津液枯燥者集聖九去砂仁莪
朮加龍胆草治之

有因吐泄下痢而成痢者集聖九去青皮莪朮加白
朮芍豆蔻柯子治之亦無服參苓白朮九治之

有因久癰不退而成癰者集聖九加鱉甲治之

有因食積而成疳其腹痛者集聖丸去歸身加川楝
子肉小茴香三棱治之

有因虫痛而成疳者本方去歸身加白芷黃川楝子
肉治之

有因脾胃久虛不能運轉以致其氣或胎中受毒胎
前血少以致手足細弱小兒高黃削作瘦者前
丁真補露之症皆以集聖丸參朮白朮丸治之
有因乳母恣食五辛酒麵致令小兒日則煩渴
飲水乳食下泄夜則渴止此名疳渴以集聖丸去

我木砂仁加人參白朮治之無服人參麥冬散之治

凡疳症熱者虛中之熱冷者虛中之冷治熱不可用
涼治冷不可用溫尤不可囑雲施汗下以致殺人

凡小兒界見黃瘦作抽脾大腰痛不眠乳食者即服
五疳積丸或集聖丸治

凡治疳疔不必細分五疳何虛則補之熱則清之冷
則溫之吐則治吐痢則治痢積則治積蟲則治蟲
不出集聖丸加戒用之屢試有驗

凡有死毒疳者臍后項邊有核如彈子按之則動軟

而不動久則肢體離齋便溺膿血壯熱癰疽頭露
骨是也凡見此症速破其核有索如米粉膏藥貼
之內服集聖丸調治

集聖丸

芎藭焙乾 五靈脂炒 夜明砂淘去 煨縮砂仁炒 木香

陳皮去 義術使君肉 黃連川芎 酒洗炒

龍膽炙 當歸青皮 因于虛者加人參二

白朮三 去義術青皮五靈脂 因于熱者加龍胆

草三 去砂仁義術 因于瘡者加鱉甲炙焦 三

因于吐泄下痢者加白朮二肉豆蔻煨柯子肉各

去青皮莪朮因于積痛者加三棱煨川練子肉

小茴香煨去當歸川因于虫者加蘇莧半

川練肉二去婦等因于渴者加人參白朮各

莪朮砂仁右為末用雄豬胆二個取汁和麵

糊為丸米飲送下

參苓白朮丸

人參白朮白茯苓甘草山藥白扁豆

附便薏米蓮肉各一加婦身半川芎七共為

米神曲糊丸米飲送下

人參麥冬散

人參 白朮 麥冬 黃連 甘草 乾葛

柴胡 竹葉引

五疳消積丸

使君子肉炒 五棗炒 陳皮 神曲 山楂肉

白燕羹 黃連 胆草 各等分為末 陳米飯為丸

丸米飲送下

西江月

小兒疳癆又陰愚夫不識根苗面无血色髮穗焦壯
大頭乾脚小吐泄時上舉癆似癰非癰來潮吃泥
弄舌滯頤交不治休嗟命夭

小兒食傷脾胃疳勞煩此虛羸黃連芦荈解蒸危我
木鱉青去積當歸川芎養血夜砂君子攷細乾蟬
木香五靈脂粟米糊丸為最

大小便門

凡小兒有病或肚脹痛或驚大小便不通者此疳積
危看虛實急通利之

如小兒形實熱甚內服三黃丸外用貼臍法即通
如小兒形怯不可下者用熨臍法即通
如用上法不通又加腹脹氣喘多哭悶亂目上視手足
冷者不可治也

凡小便不通者有陰陽二症陰閉者冷溫棄虛入裡
因而不通五苓散加雨水香為末空心煎湯調服
外用炒鹽熨臍即通陽閉者因暴熱所逼澀而不
通輕者五苓散加車前子灯心治之重者以木通
散外用熨臍法即通

小便淋澀者蓋小腸為受盛之府氣通于膀胱膀胱者為津液之府氣通于腎小便澀腎水之道澀而不利故小便澀去其熱次以香芎九調之不論五淋治法同小便出血者熱之極也蓋心生血于小腸相合熱其則失其常道故不流滲入于胞故小便血出也以導赤散加蒲黃末空心時灯心湯送下小便出白者初出微赤良久澄白如米泔狀此由乳哺失節有傷于脾致令清濁不分而色白也久則

戒痺以分清飲主之

祖傳治小便白色如米泔者以胃苓丸溫藥湯下
小便不禁此腎與膀胱俱虛而冷氣乘之故不能制
其尿出而不禁謂之遺尿睡裡自出者謂之尿床
俱以雞腸散治更以地黃丸調之

凡大小便不通者有虛有熱虛者津液不足大腸乾
澀而秘結內服通幽湯甚有用導法

熱者臍臍積熱內有燥糞其腹必痛或作渴內服三

黃丸外用導法

大便下血者是大腸中有積熱也因恣食酒麵炙煨
熱物流入心肺血熱妄行滲入腸中故大便下血
久則脏毒无時下血黃連丸主之

凡小兒初生七日之內大小便有血者此胎毒也不
可用他藥只以生地黃取自然汁入蜜少許和勻
溫服之自愈

凡小兒非月內大小便有血者此積熱在心肺二經
熱積于心故小便出血熱積于肺故大腸出血三
黃解毒湯主之

小兒出痘疹之時大小便血者此熱毒內
壞乃危症也難收

凡小兒常時糞后出血不止者此名野雞痢地榆丸
主之

木通散

木通 扁蓄 大黃 瞿麥 滑石 赤茯苓

枝仁 儵菰 車前子 升草梢 灯心引

八正散

滑石 瞿麥 大黃 木通 扁蓄 車前子

卷之五

集

山枝仁 井草梢 加黃精 灯心引

育考丸

香附 川芎 赤芍 各五 海金沙 滑石 各一

枳壳 澤泄 石膏 煨即 各三 與為末糯米粥

糊丸麥冬湯送下

如小便澀痛精取長流急處順水用火微溫入鹽少

許調勻空心服

分清飲

高蒲 烏集 加枝苓

各等分為末，灯心引水煎服。

雞腸散

雞腸

燒男用，雌女用。

壯男，煨白茯苓。

桑礞硝

微炒，各五

龍骨

各二，共為粗末，姜枣湯服。

黃芩

雞地

酒浸，焙八

山茱萸肉

山藥，各四

澤泄

丹皮

白茯苓

各五

共為末，煉蜜為丸，溫水空心服。

通幽湯

生地

升麻

桃仁泥

歸身

甘草

紅花

麻仁 炒 加大黄 水煎调枳即末服

黄連九

黄連

五

梔子

炒

侧柏葉

炒

枳壳

荆芥穗

各三

分

地榆

三

虎骨

者

知

蛻皮

候

三

為末

醋糊

丸

飲送下

三黃解毒湯

黃連

黃芩

黃柏

紅花

木通

大黃

生地

歸身

甘草

水煎服

地榆丸

防風 烏桕心 枳壳 阿膠 升麻 剉升麻

黃連 生地 當歸身 槐花 白朮 伏龍肝

不和丸陳米飲下 加地榆

貼臍法

用田螺大者搥爛貼臍下能開結毒

熨臍法

用連鬚葱一根不洗去泥土生薑一片淡豆豉二十一粒鹽二匙同研搥作餅燒銚子烘熱餅掩臍中以厚綿絮繫定良久氣通自利不然再換

胆導法

用猪胆大者一個將鵝毛筒截去兩頭一頭揀入
胆中用線扎定不令移動着口吹氣入胆內又以
線作活套子扎定其氣將鵝毛筒向內納入谷道
中取出活套揀胆汁入腹中須臾氣通自利

西江月

大便不通症候有虛有實不同虛為津液少流通腸
澀不能傳送內服通幽湯劑外貼導疏通膏是
也症腹中痞屎燥三苦可用

若是傷食症候腹中必作痛疼面黃便秘禁藥用
九轉靈應大便是下血大腸積熱之因連槐花
栢榆柳荊脫肛蠅皮加增

糞后時常出血地榆九子高強防風枳殼與生黃地
榆當歸為上烏梅甘草柯子黃連荊芥同行伏龍
槐花白朮當米醋為丸吞服

小便不通症治陰閉陽閉須知陰為風冷入乘虛五
苓木香加入又加靈砂為末空心鹽湯吞之外用
鹽炒熨其臍壯氣流通曰滯

陽閉暴熱所通其症唇赤面紅便如敗滴血鮮流五
苓車前加用或用剪紅散于車前八正木通外用
熨臍法即通活幼之功可頌

又有濕痰下墜其兒体胖身肥喉中有痰面微紅小
便落地降注其形渾如米泔此症不可胡為二陳
湯內增蒼朮木通并麻加八

初胎有微紅色良久澄白如泔此由乳食損脾元清
濁不分症現治用分清飲子或用胃苓湯先補脾
肌滯法為先脾實方為此患

凡治小便不通涼藥不可多施若用田螺貼其脬區
寒入腹難出宜用人參白朮茯苓甘草相隨再加
車前與滑石并麻朮通併入

大小二便俱閉此症果是凶危先通大便最為宜小
便自然通利藥用九轉靈應車前煎水調之此般
治法實為奇醫者銘心牢記

大小二便下血心肺積熱相攻三黃解毒有神功黃
連黃芩相共黃柏紅花生地大黃甘草木通當歸
只可用其身白水煎湯相送

頭項門

小兒之頭四時要涼但見頭熱即有病生可預服抱
龍丸

小兒頭顙腫大青筋顯露者此肝熱也瀉青丸主之
頭顙腫起者此因熱在內其氣上冲故而腫起宜
退熱疏風瀉青丸抱龍丸主之

小兒死^病項軟者此肝熱有風也瀉青丸主之

顙門下陷者此因久病肺脾虛弱氣不上行故下陷
如坑參苓白朮丸主之已成疳者集聖丸主之

開而不合者此腎氣有虧名曰解顙乃惡病也
宜內服地黃丸外用封顙法

久病之后其頸軟者此天柱骨倒乃危症也當大補
氣血八物湯主之以養養末調服

小兒生下使頸軟者此胎氣不足地黃丸主之

封顙法

用大南星微炮為末米醋調塗絹帛上烘熱貼之
以合為度

目病門

黑珠屬肝白珠屬肺瞳仁屬腎兩角屬心兩胞屬脾

目內赤者心經積熱上攻導赤散加黃連防風

方見驚風

祖傳治小兒目赤者以涼驚丸菊花煎湯下

目內黃者脾熱也瀉黃散主之目胞腫者同治

目連劄者肝有風也凡嘔或新或久皆引肝風目屬

肝風入目上下左右如風吹兒不能任故連劄也

用瀉青丸主之

方見驚門

目直視者肝有熱也熱入于目牽其筋腠目之兩角

俱繫不能轉視故目直也俱用瀉青丸主之

小兒初生其目閉者此胎熱也內連服生地黃湯
外用胆草煎水洗目上一日七次恐緩則損目

小兒生下眼胞赤爛者此因生時洗拭不淨以致穢
汚滿兩角中故兩胞赤爛至長不瘳其金散主之
小兒久嗽其目兩眶紫黑如物傷損白珠紅赤如血
謂之血眼內服玉液丸外用貼法

小兒生下月久之后目不見物者謂之雀目此肝虛
也用地黃丸治之以猪羊肝吞嚥

小兒痘疹之后目內有膜者以谷精散主之

小兒熱病其目羞明喜暗者此風熱也宜解風熱以

清阳散火湯主之

小兒泄后目有白膜閉不能開及无精光者難治

濁黃散

藿香葉七 山枝仁一 石茱五 耳草七 卜一 防風二 炙

石劉細用蜜拌炒但微炒為末水煎溫服

真金散

黃連 黃柏 當歸 赤芍 各二 杏仁五 去皮炙

右劉細用乳汁浸一宿晒乾為末生地黄汁調一

字頻 點眼以新帛蘸荆芥湯洗之

生地黄湯

生地黄 赤芍 川芎 歸身 升麻 天麻

各等分 搗末 每少許 灯酒調服

貼

生地黄 無豆豉 研成膏 貼目上 其血自散 如血

出腫 黑自消 甚妙

不精草散

谷精草 二 蟬退 三 去翅足 密蒙花 五 白蒺藜 炒 去刺

共為末每用一升取雄猪肝一兩竹刀剖開擦藥
于內以草束定水煎肝熟令兒食肝飲湯

清阳散火湯

黃芩 荆芥穗 川芎 防風 薄荷葉 甘草

連翹 山枝仁 當歸 石菖蒲 羌活 水煎服

小兒驚風目斜視而不轉睛者灸風池穴目左斜灸

右穴右斜灸左穴

西江月

小兒眼目多病皆因自食酸其胎生邪熱灸其肝冲

發于目為患或為赤腫痒痛或多眵淚遮慢甚則翳膜掩瞳間更有睛盲省眼

眼目部分常識五臟各屬一位黑珠屬肝白珠肺腫人又為腎水大小兩角雖異心火是則屬之上下兩胞屬何如脾土中央定位

目內常見赤色心經積熱上冲導赤加連併防風更有洗心堪用又或現出黃色此為脾熱蒸攻瀉黃散予有神功此方又治浮腫

小兒目患赤痛難用點藥醫效只將湯藥內疏通外

用款藥止痛湯藥洗心肝散敷藥四螺連同二味
共研要通融紙攤貼之休動

如或要用點藥莫將眩藥雜禁只把黃連細研勻將
大田螺水浸藥末納入螺內須臾黃水流行蘸水
點入眼中存熱退涼生痛定

目痛肝家風熱瀉肝散是仙方外用乳洗目清涼
使點藥輕安久病目生白膜肝虛之症消詳虛則
補毋用地黃養血養精為上

耳病門

耳竅屬腎耳珠前屬少陽耳病有五皆由于腎經氣
實熱氣上冲于耳遂使津液壅而為膿為清汁也
亦有因沐浴水入耳中無為聾耳內服蔓荊子散
外用龍骨散搽之

耳珠前后生瘡浸淫不愈皆黃蘗散主之

耳傍赤腫若此熱毒也若不急治必成大癰外用款
毒散內服消毒飲

凡暴聾者此氣閉也通竅丸主之

耳內入耳者以清油灌之其蟲即出又用兩刀于耳

虎磨其虫聞磨刀声即出

臘耳方 用蛇退焙具存性研末吹入耳中幼

黃荆子散

黃荆子 并軍 乾葛花 并麻 赤芍 前胡

桑白皮 炒木通 麥冬 生地黃 赤茯苓

姜枣引

龍骨散

龍骨 白枯丸 各三 射有 少 黃丹 腰二 胭脂 名一

均細末以綿展乾臘用筒吹藥入耳

黃藥散

黃柏

白枯丸

海礞石

滑石

龍骨各等分

為末溫用乾搥乾用猪油調敷

救毒散

用最豆粉不拘多少或且研細末以淡醋調敷
處乾則易之

清毒飲

羌活

防風

黃芩

連翹

桔梗

甘草

人參

川芎

當歸

柴胡

水煎服

通竅丸

用磁石

一各

射香

五

同研成丸

如來核

大綿裹之

納耳中

又以

錫鉄一塊

熱酒

泡過

含口中

須臾

氣

即通矣

西江月

尋常耳中水出日久就結難通雖然停耳不為患只

恐成膿堪痛治在少附風熱腎經濕熱同攻紅綿

籍血可消膿方予分明選用

鼻竅門

鼻為肺之竅鼻塞者熱肺氣不通于竅然肺主鼻

風寒外感則肺氣壅閉而鼻塞川芎膏主之

鼻涕者肺為風寒所襲而津液不收則為鼻涕細辛

散主之

鼽鼻者肺受風寒久而不散膿涕結聚不開使不開

香臭則鼽矣萬金膏主之

以上三症皆宜通利俱用如味厚澤通氣散

鼻乾者心脾有熱上蒸于肺故津液枯竭而結當清

熱生津導赤散吞飽龍丸治之

如痛已極鼻乾而黑竅張長出冷氣者此肺絕也必

死之症

鼻淵者流下淫涕極其腥臭此胆移熱于腦又名腦
崩華萸散主之

凡小兒初生三朝五日一臘忽然鼻塞不能吮乳不
得呼吸者因乳母安卧之時而不知迴避鼻中出
氣吹着兒顙門或因洗浴用水溫冷又不避風邪
所以致兒鼻塞通關散治之

鼻衄者是五臟積熱所為也蓋血隨氣行今得熱則
熱氣動而妄行溢出于鼻也宜涼血為主內服加

威地黃湯外用吹鼻散

川考膏

川考

細辛

藥本

白芷

牛草

三

龍腦

分五

射香

丑

杏仁

七

去皮尖

共為末

煉蜜為丸

灯心湯

化

明

如体弱者歸衆一九塞鼻孔中男左女右

細

辛散

細辛

前胡

防風

川考

人參

甘草

各等分為末乳香湯調服

萬金膏

羌活 川芎 細辛 蔓荊 麻黃 石膏 藜蘆

龍腦 許少射香許少

加味 麗澤通氣散

寇活 独活 香木 蘇合 升麻 荆芥 穗

葛根 升麻 炙細辛 麻黃 白芷 川芎

木通 姜三片 束二枚 葱白三寸 水煎食后服

辛夷散

辛夷仁 五 蒼耳子 焙二 白芷 一 薄荷葉 五 黃連 一

共晒乾為末 葱湯調服

香附子 川芎 荊芥穗 僵蚕 細辛 牙皂
共為末以葱白搗成膏攤絹細上烘乾臨卧時貼

顙門

加減地黃湯

生地 黃芩 枳子仁 赤芍 鬱金 茅花引

水煎入車前草自然汁細服之

吹鼻散

山枝仁 亂頭髮燒灰 共為末吹入鼻中

祖傳治衄血用神芎九茅花煎湯可

西江月

小兒若是鼻塞風寒各有根由傷風清涕必長流乾
燥傷寒挑搞清涕荆防發散乾燥火挑中水苓連
枝柯可同傳引用葱姜平復

忽然鼻中衄血五臟積熱所為血隨氣上溢于鼻治
用涼血為主川芎當歸赤芍生地黃芩生枝黃連
甘草牡丹皮栢葉茅根煎吃

口瘡門

脾之竅唇內應乎脾

小兒鵝口者口內白屑滿舌上如鵝之口者此為胎
熱而心脾最甚重發于口也當內服涼驚丸外用
鵝口中涎以絹包手指洗淨以保命散吹之此亦
名口瘡

口瘡者謂口赤瘡此因胎稟本厚若有過溫心脾積
熱熏蒸于上以成口瘡內服涼驚丸外用地雞搖
水遍塗瘡上又以一連散敷之地雞即烏魚人家
以上二症如服涼驚丸不效洗心散一服如神

口糜者滿口生潰爛乃膀胱移熱于小腸腸不便
上為口糜以導赤散去小腸熱五苓散去膀胱熱
當以導赤散調五苓散主之

口瘡服涼藥不効乃肝脾氣不足虛火泛上而无制
用理中湯治之外用官桂末吹之

口泄后口生瘡者亦是虛火理中湯主之

小兒上脘有脹起如懸癰者此名重膈由脾胃積熱
血氣不能收斂而成此若用針刺去惡血內服涼
而散外用碧雪散吹之惟若服涼驚丸

小兒兩頤流涎涎潰胸前者此滯頤蓋涎者脾之

口為脾之竅由脾胃虛冷不能收斂津液故涎黏
口出而潰于頤者宜溫脾丹主之

小兒口頻撮者氣不和也蓋唇應乎脾氣乃肺之所
生脾虛不能養子故口頻撮宜補其母則氣自和
以異攻散主之

小兒口撮面青多哭者此臍下痛也理中湯主之

初生因臍風口撮臍腹腫者不治

小兒急欲乳吃而口不吮乳者此心脾有熱瀉黃散

治之

保命散

一名硃凡散

硃砂

白枯凡

五牙硝五

共為細末搽舌上

一連散

即泄心湯

黃連為末蜜水調

洗心散

白朮

甘草

當歸

荆芥

加生地

大黃

煨

麻黃

赤芍

薄荷葉

生薑引

碧雪散

蒲黃

青黛

硃砂

火硝

生耳草

苛分為

末次之

溫脾丹

木香

半夏

各五

生薑

白朮

各一

青皮

各一

陳皮

共研末糊為丸米飲下

異攻散

人參

白朮

茯苓

甘草

陳皮

姜棗

引食

前溫服

小兒鵝口口瘡重勝不能吮乳咽喉腫塞者用

青黛散

青黛

二

黃連

黃柏

各五

牙

硝

各一

辰砂

各一

雄黃

各一

黃

硼砂

牛黃

各

子

腦

各一

共

為

細

末

先

以

薄荷

汁

拭

口

后

擦

藥

入

口

每

用

二

分

半

西江月

小

兒

心

脾

積

熱

唇

口

舌

上

生

瘡

白

為

鵝

口

屑

浮

霜

赤

者

石

櫛

子

搽

上

下

口

唇

破

裂

令

兒

乳

食

難

彈

洗

心

涼

隔

是

奇

方

搽

洗

各

宜

作

當

舌病門

舌與屬心舌根屬脾

蓋舌有心脾有熱也蓋心候乎舌而主血脾之脉
出于舌下若心脾有熱則氣俱盛附舌根而重生
一物形如舌而短小內服涼膈散外用針刺去惡
血以蒲黃和黃柏敷之

木舌者心脾積熱之氣上冲故令舌腫漸長大塞
滿口中若不收急必致害人內服涼膈散以針刺
去惡血用碧雪散和竹瀝敷之

弄舌者脾脏微熱令舌絡緊時舌體青白冷藥及下

之少以瀉黃散服之亦或飲水面无紅白色者此
脾胃少津液故耳不可誤認爲熱以白朮散主之
面黃肌瘦五心煩熱弄舌者此痺症也集聖丸主之
大病后用藥而舌弄者凶舌上生白胎者此丹田積
熱也內服瀉驚丸外用碧雪散治之

舌上生黑胎者其熱已劇急以蒲荷煎水洗之如紅
者可治以涼膈散下之洗下紅者必死
舌上生胎又加大熱者不可治十有九死
此胎后舌上生白胎者此虛熱也理中湯主之

涼膈散

連翹

山枝仁

大黃

薄荷葉

黃芩

甘草

芒硝

姜汁少許引

西江月

兒重舌木舌心脾蘊熱攻中舌下生舌兩重不
舌大硬腫痛急用針刺去血何妨鮮血凝紅枯
搽上有神功解熱消風可用

牙齒門

上片牙屬胃下片牙屬大腸齒屬腎

凡齒生遲者腎氣不足也蓋腎主骨齒者骨之餘腎
不足則髓虧髓虧則不能充乎齒所以齒生遲也
以地黃丸治之

上下齒床腫者此陽明寒熱也涼膈散以酒煮大黃
為君加知母石膏升麻為佐頻々含漱牙齦謂之

重齦者腎虛積熱附齦腫痛謂之重齦以針刺去其
血用鹽湯洗淨黃柏末敷之

小兒多食肉牙齒與息不可近者此陽明有熱也內
服柿劫丸外用姜汁調涎含漱

牙疳者狀如狐惑初作與氣次則牙齒黑甚則銀肉爛而出血名曰宣露此由腎熱其氣奔上焦故以走馬為喻當速治之若上下唇破鼻穿牙齒落者此名崩砂氣喘痰潮飲食減少則不可治當內服黃柏丸外用如至散敷之

咬牙者風熱也由陰明大腸二經積熱則生風故令相擊而作聲必于夢中者蓋動則風散于表靜則風歸于裏也宣風散主之

上唇生瘡虫食其脰曰盛下唇生瘡虫食其脰曰狐

出傷寒指掌之言孤感者取其進退猶豫之義

咬牙惟痘疹中有此者為危餘无大害亦有因病战

栗鼓頤而閉牙者治其病則自止矣

牙齦落而不再生者由于舌絃之故其肉頑厚用針

刺出血以肌膏散擦之即生

大蛤散治牙疳

雄黃

枯

凡各五

五倍子

二

蚕退紙

一外燒

共為

末先以米泔水洗淨以藥搽上一日三四次為愈

蚕退紙散

治牙疳

桑道紙燒五分灰人中白五分燒紅楊片五分白砒一分

燒烟共為末搽之

神効丸

蘭香葉當歸藿香葉木香各一升麻二升

生地酒洗甘草各二黃黃炒砂仁各五共為末

湯浸蒸餅為丸白湯送下

黃栢丸

黃栢半生為末煉蜜丸白湯送下

如全散

用婦人尿 桶中白垢刮取煨尽烟氣一銅索二分

射香半分 共為末先以臘葉浸米泔水洗淨血后

搽此藥

宣風散

檳榔二陳皮 甘草各及半 牽牛半生炒 共為末蜜水

調食前服

鼠骨散

用雄鼠一個爛尽肉取骨研末加射香少許和

擦姜湯漱口

西江月

上下牙齦黑爛銀宣息露堪嗟敗唇穿鼻落齒牙迅
速呼為走馬內壞咽喉可畏啼聲漸變啞啞又名
狐惑兆非佳治鑒四瘡无價

咽喉門

咽者胃腕主納入脊喉者肺腕主氣出入為一身之
樞要若胸膈間蘊積熱毒致生風痰壅滯而不散
矣而為咽喉病名雖數種皆受熱毒宜速解熱毒
緩則有難救之患輕則并指湯重則化毒湯主之

如出痘者而咽喉痛者此毒氣上攻也加減并桔湯

主之喉中生瘡不能吮乳者化毒湯主之

小兒為諸骨所哽骨大難嚥者以鵝羽掃喉吐虫骨

小兒用海上方及視由科治之不治恐傷人

誤吞麥生者取梅口中涎嚥之即効

耳桔湯

桔梗 甘草 人參 水煎細玉吞之

化毒湯

桔梗 五消荷葉

別 藥 各 二 升 半 小 兒 一

山豆根

半斤

牙硝

硃砂

各二

半斤

雄黃

辰砂

各二

半斤

為細末吹之或以水調服

海上方

用金鳳花根搥碎米醋煎用有甯瓶盛之將口封

紙嘴仰面嚙之其清即出吞時勿令沾牙

用玉簪花根亦可或威靈仙根亦可俱如前法

祝由科

用淨水半碗一紙書龍師火帝七遍吞水即効

西江月

小兒咽喉部位一身難命所關極重毒隔胸間致
生風痰不散病難數種各別治宜去痰為先後解
風熱病斯痊是有難收之患

咽喉若然有疾治宜認其重輕若井枯散先行重
則化毒當進如或喉腫口禁開散子宜薰喉風
急收散通神吐痰消腫退病

如患單乳鵝瘡治者不可明行可針之症要用針不
當針時要集只用燕麥痔藥退後依次施行蟾酥
錠子點瘡疔瘡毒自消可幸

形声門

髮乃血之餘腎之苗也小兒髮久不生維生不異而
稀此由腎氣衰則血氣不足之故也地黃丸主之
齒乃骨之餘骨者腎所主也齒久不生維生而不齊
者此腎虛故也地黃丸主之

行遲者何也蓋骨乃髓之所養血氣不充則髓不滿
骨故軟弱不能行此由腎與肝俱虛得之蓋肝主
筋筋弱而不能早行腎主骨骨弱而不堅加味地
黃丸主之

脚細者稟受不足氣血不充故肌肉瘦薄骨節俱露

如鶴之膝此亦由腎虛名鶴膝節加味地黃丸

主

小兒大病后手足痿弱及驚風后手足痿緩併宜加

減地黃丸主之

語遲者由兒在胎之時母受驚邪之氣兼心兒感母

氣心忡不定不能榮舌故而語遲當補丸主之

凡吐泄及大病后雖有聲而不能言又能進藥此外

失音乃腎怯不能上接乎咽也地黃丸主之

有卒暴寒冷而声不出者此脾風邪也加味瀉白散

主之

龜胸者其胸高腫狀如龜背由客風吹脊入于骨髓

主之

此症多成痼疾間有灸肺俞二第

三推骨節下兩

傍各寸半膈俞穴第二骨下兩傍各寸半如此而

收功者然未見効也以揲壳丸主之

地黃丸

地黃酒蒸山茱萸去山藥各四津泄白茯苓

汗皮各三 腎弱失音者加 巴戟心去 石膏肅各三

煉蜜為丸 麥冬湯下

加味地黃丸

虎脰骨酒炙 生地黃 酸棗仁炒 辣桂 白茯苓

防風 當歸 如驚后得前症者加 羌活

煉蜜為丸 白湯下

為清丸

人參 石膏肅 麥冬心去 遠志肉第 川芎

當歸各三 滴乳香 硃砂各一 因于驚得者加

斗胆

南星

三

煉蜜為丸米飲下

加減

葶九

大黃

煨

天冬

片

杏仁

去皮

尖

有金

桑白皮

炒

木通

甜葶

葶

炒

蜜九

滾白

水送下

顛顛

詩

七言

乳食不

常飽

起寒熱

積脾氣

上冲

散成

此症

隨經

行

重風

熱相交

未易

攻治

宜退

熱

疏風

症泄

青

九子

顯神

功

顯隔

詩

七言

瀉泄久而氣血虛不能上冲元氣虧損脊失黃為紐
末雞蛋白調服即愈藥用參苓白朮散服之此症
頃能除

滯順詩七言

脾胃虛寒涎自流不能收斂漬順謀半朮姜陳膏皮
末一歲一丸米飲後

語遲詩七言

受胎母即有驚耶二氣乘心舌未加舊驚振神參遠
志來冬當歸乳香砂蜜丸粟大吞二十薄荷湯下

可見瘥

行遲詩七言

肝腎二經俱不足肝主筋腎主骨若要二經氣血

充加味地黃能助補

龜胸詩五言

小兒龜胸症肺熱服于胸加減浮虛丸服之有神功

龜背詩五言

龜背為惡症腎風入骨髓內服枳朮丸灸法宜相繼

髮齒生遲詩七言

髮久不生，不黑齒久不生，不齊賢虛血弱成斯

症地黃丸子俱能治

鮮顯

四言句

鮮顯八物有熱加連以綿繫束香附白欬

鶴膝

四言句

小兒鶴膝此屬腎虛地黃加味服却无虞

諸瘡門

小兒初生遍身生虫瘡及流涎瘡皆胎毒也切

勿憚染恐逼毒入腹宜服胡麻丸

凡有誤用搽藥通毒入腹以致腹脹者解
凡有頸面遍身生瘡非干搽藥忽然自平加痰喘者
切不可解利當以連喬湯治之以上數症俱是胎
毒不可用灸法

其有一歲以上生泥水瘡者此血風瘡也胡麻丸主
痘瘡后生膿泡瘡者此痘風瘡以胡麻丸治之
以上二症俱是風熱宜灸風池穴曲池穴血海穴
足三里穴各灸三壯

連喬湯

鹿角 人參 川芎 黃連 生甘草 陳皮

白芍 木通 水煎入竹瀝服

小兒生癰毒腫癰者皆因氣血凝而熱乘之內服解毒湯外用貼藥如已潰者內服木桶湯外用紫金錠塗之

解毒湯

玄參 連翹 升麻 黃芩 赤芍 附子

羌活 防風 生地 甘草 剉芥穗 秘結者

加大黃 木通

八補湯

人參 黃芪 川芎 連翹 白芷 白茯苓

當歸 生地 白朮 耳草 赤芍 姜朮引

紫金錠

山慈姑 三 五倍子 三 大戟 兩 續隨子肉 一 射香 三

雄黃 硃砂 各一 為末糯米糊作錠子磨水搽

貼藥

黃芩 黃連 黃柏 各二 大黃 蒲黃 各三 血結

乳香 各二 沒藥 二 射香 少許 共為末取生薑自然

卷之三

庚

汁和雞蛋清打勻調藥貼之

頭上生軟癰膿水不乾者用紫金錠搽之自愈用車
方搽亦効

車方

用上好磁器不拘多少研為極細末雞子清調搽
天方

大枳壳一個去穰令室磨令口平以麪糊塗抹枳
壳四圍安貼于癰上自破膿血流尽先于一邊以
灯草一根通之癰瘡便无痕迹

又方

用石灰篩過以雞子清和灰為丸入炭火燒煉通紅如此搥和三次依法煅煉取研細香油調敷頸上生核腫脹發熱者內服連喬丸外用五倍子為末淡米醋調敷一日二次易之効

連喬丸

連喬	桑白皮	白頭翁	牡丹皮	防風
黃柏	肉桂	豆豉	獨活	秦花
				各五斤
海礞硝	半三斤	為末煉蜜丸	灯心湯下	

西江月

小兒遍身瘡疥虫窠膿血浸淫此由胎毒內藏深故
有許多形症涼血散虫解毒胡麻丸子通神切防
搽洗毒歸心版痛神昏命危

若是要用搽藥瘡痒無過蛇床子黃虫作楚用雄黃痛
腫喉水為當不痒須加狗脊喜鹽湯火礞黃斑貓
同研熟由良手搽鼻聞搽上

丹毒門

小兒赤遊丹毒雖有十種皆由心火內盛熱與血搏

或起于手足或起于頭而胸背遊移上下其起如
火痛不可言亦如片砂故名丹毒自腹出四肢者
易治自四肢入腹者難治癰此症者其法必先用
表藥以解熱毒方可搽敷若遽用藥搽使氣无所
泄而入于裏傷人者多矣

小兒丹毒一歲以下者易治未週歲者難治
百因驚后而發丹者此毒氣由內出外易治有先發
丹而后驚者此毒氣由外入內者多死不治
一從頭項起者名飛灶丹

- 二從頭上起者名走炷丹
- 三從面上起者名炷火丹
- 四從背上起者名天火丹
- 五從兩手起者名天炷丹
- 六從兩脇起者名水丹
- 七從臍起者名胡芦丹
- 八從兩腳起者名野火丹
- 九從兩腳背起者名烟火丹
- 十從阴上起者名胡漏丹

飛丹

先用葱白水自然汁搽

走炆丹

紅腫痛

用赤小豆末雞子清調搽

鬼火丹

用伏龍肝雞子清調搽

天火丹

用桑白皮末羊脂調搽

天壯丹

用柳木燒灰水調搽

水丹

用生鉄秀末猪脂調搽

胡芦丹

用煨即末米醋調搽

印火丹

用乳香末羊脂調搽

翻火丹

用猪槽下土清油調搽

胡漏丹 用屋漏處的土半脂調搽

五淋上十種丹毒俱先服防風升麻湯以解其毒次用熨針法以去其毒血如無熨針用砭針法然後用救急法

防風升麻湯

防風 升麻 山棧仁 甘草 麥冬去 荆芥穗

木通 葛根 滑精藥 白參 連翹 牛黃子

便秘者加 大黃 水煎服

熨針法

用水蜈蚣條放于江腫處令吃出毒血立愈

砭針法

用磁瓦片打成尖鋒以快子夾定扎住連刺令出
惡血

急救法

取灶心對鍋底焦土研末以新汲水調搽乾則之易
小兒丹毒腹脹氣喘悶亂不乳反驚搐者皆不可治
小兒生后百日之內半歲以上忽兩眼胞紅暈微起
面青黧色夜則煩哭或除如胭脂此因伏熱在內

發之于外初則滿面狀如水痘腳微紅而不壯出
沒休息无定次至頸項赤如丹砂名為驚丹以三
鮮散治之

三鮮散

人參	防風	天麻	膽金	茯神	白附子
大黃	黃芩	羌活	金燭	枳殼	蒡子
粉草	赤芍	灯心			

小兒驚風后風從氣行而逆氣使毒氣蓄于皮膚流
為腫毒多在腮頰耳根間成癰成瘡謂之毒風宜

內服當歸百解散外用拂毒散敷之

當歸百解散

當歸 赤芍 大黃 川芎 升麻 蒲荷葉

乾葛 麻黃 黃芩 甘草 枳殼 皂角刺

葱姜引

拂毒散

半夏 紅貝母 大黃 朴硝 五倍子 各半

共為末淡醋調敷患處乾則易之

小兒或因跌撲刀斧破傷皮膚風邪侵襲傷處發此

謂之破傷風宜內服疏風活血散外以紫金丹塗之

疏風活血散

當歸

生地

川芎

赤芍

荆芥

防風

甘草

紅花

蘇木

水煎服入酒少許

西江月

小兒赤遊丹毒雖有十種原根皆由心火熱多痰上下遊移不定其色渾如丹石故稱丹毒之名治法方冊甚分明余在匠家体認

小兒流丹最毒十種發出不同自上而下
下至腎可慟半週之內休見滿週病此宜攻蟬針
的之有神功內解外敷煎用
內解婦稍赤芍菟活荊芥防風非麻非草地黃通竹
葉玄參煎用外用蠶元付貼更加寒水相同三朝
五日急相攻驚搐靈丹如夢
治丹用功次第從頭一鋪陳解表下毒藥先行次
用蟬針吮進若是蟬針不便須更急用砭針然後
塗藥救孩身此法前人已免

捷法先須解毒或將利藥通初起塗敷莫胡攷毒
入于裏過壅解毒無價散子防風升麻湯同利藥
靈應有神功只在匠人善用

經驗治刀妙法而今說與后人先將靈應滌病身下
店彈施塗潤田螺搗餅敷貼或用水調灶心灰
南星大黃停芒硝研勻水浸

烘挂衣與兒

火丹遂成之

芒硝寒水石

青黛石羔奇

赤曉因何起

胎中受熱多

原舉先大害

不必諸臣和

斑疹癰疹門

小兒斑疹其掀腫于外者屬少陽相火也謂之斑紅
點在皮膚之中不出者屬少陰君火也謂之疹
其症有陰陽輕重之別陽斑用托裏消熱化斑涼血
此急治其標也陰疹用調中溫胃其疹自消此緩
則治其本也大抵安裏之藥多發表之藥少首尾
不可妄下四毒者或發于面部或發于背部或發
于四肢極其稠密狀如錦紋紅赤者胃熱也紫黑

者胃爛也一則下之早其熱乘虛而入胃一則下
之晚其胃熱不得發越當服消斑青黛飲明疹者
或出胸背手足稀而小者此由失守之火聚于胸
中上薰于肺傳于皮膚而成斑點如蚊蚋蚤虱所
咬而非錦紋也宜服理中湯治之其火自降其斑
自退矣

班疹者自吐泄者慎勿亂治因其毒氣上下皆出宜
調中氣若吐泄之后遍身發班如錦紋者此熱即
乘虛入胃其症多得于夏天化斑湯主之

消斑青黛飲

黃連 升麻 石燕 知母 柴胡 山枝仁

玄參 升麻 生地 黃芩 人參 青黛

姜三片 豆豉二十粒引

調中湯

蒼朮 陳皮 砂仁 白芍 炒 升麻 薑黃 薑黃

桔梗 半夏 白芷 羌活 枳殼 川芎

姜三片引

化斑湯

人參 石膏 知母 甘草 水蘗粳米引

如斑紅者易治異者難治

竹

小兒癰疹多屬于脾以其隱隱在皮膚之間發而多
痒或不紅者併風與濕而成也加味羌活散治之
或加減攻毒散亦効

加味羌活散

羌活 前胡 人參 桔梗 甘草 薄荷葉

枳壳 川芎 天麻 茯苓 鮮薑 薑三片引

加減攻毒散

下缺

羌活

枳活

前胡

柴胡

當歸

川芎

枳壳

桔梗

茯苓

人參

甘草

薄荷葉

防風

荊芥

蒼朮

芍藥

生地

姜朮引

續諸瘡驗方

小兒眉叢中生瘡流瀝不乾者名曰鍊銀瘡用川山

甲煎上甲炙焦為末入輕粉少許清油調敷

凍耳成瘡者內脂防風通聖散外用鉛粉以水搽細

將艾葉燻焚成烏色研末敷之

防風通聖散

防風 川芎 羌活 獨活 秦艽 大黃 山枝

赤芍 麻黃 連翹 石膏 黃芩 桔梗

滑石 荆芥 白朮 甘草 加乾葛 生薑 引

身上生瘡如粟米大成塊成路極痛者此名龍蟻瘡
用珍珠鳳尾草搗汁搽之又以渣調清油敷之効

文驗方

取糯米不拘多少浸漲搗漿淀粉搽之

治天泡瘡方

以韭菜地蛆蚬糞炒乾研極細蜜調搽